

ИППП (инфекции, передаваемые половым путем) вызываются:

- ◆ бактериями (сифилис, гонорея, хламидиоз, уреаплазмоз, бактериальный вагиноз)
- ◆ вирусами (СПИД, герпес генитальный, гепатит В, С, генитальные бородавки)
- ◆ простейшими (трихомоноз)
- ◆ дрожжеподобными грибами (кандидоз)
- ◆ паразитами и насекомыми (лобковый педикулез, чесотка).

Сифилис

является предостратимой и излечимой бактериальной инфекцией передающейся половым путем (ИППП). При отсутствии лечения он может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Возбудитель сифилиса - бледная трепонема *Treponema pallidum* – спирохета, которая не может существовать в течение долгого времени вне человеческого организма. Бледная трепонема проникает через слизистые оболочки или кожу, достигает местных лимфоузлов в течение нескольких часов и быстро распространяется по всему организму.

Инкубационный (скрытый) период составляет от 2 недель до 2 месяцев, этот период может сократиться до 8 дней или, наоборот, удлиниться до 190 дней.

В конце этого периода больной становится опасным для половых партнеров и остается таким на протяжении всего периода болезни. Особенно заразны больные первичным и вторичным сифилисом.

Заразными у больного сифилисом являются все биологические жидкости, в том числе отделяемое язв и эрозий, слизистой влагалища, сперма, кровь, спинномозговая жидкость, женское молоко.

Сифилис передается

чаще всего при половых контактах, однако не исключено и внеполовое заражение:

- ◆ инфицирование плода во время беременности;

- ◆ инфицирование новорожденного во время родов при прохождении его через родовые пути больной матери;
- ◆ заражение через кровь, например, при пользовании общими шприцами.

Симптомы и течение инфекции

Сифилису присуща волнообразность течения, где периоды обострения чередуются с периодами стихания клинической симптоматики.

Стадии сифилиса делятся на первичную, вторичную и третичную.

Но часто заболевание протекает без жалоб и симптомов (**скрытый сифилис**) и может быть выявлено при прохождении обследования у врачей других специальностей, при медицинских осмотрах или диспансеризации.

После полного излечения от сифилиса существует опасность повторного заражения.

I период сифилиса характеризуется появлением на месте внедрения трепонем эрозий или язв с твердым дном (твердый шанкр), увеличением региональных лимфоузлов (они плотные и безболезненные, подвижные, не нагнаиваются, кожа над ними не изменена).

Шанкры появляются в месте внедрения возбудителя в момент заражения. Чаще - на половых органах могут быть на слизистой прямой кишки, полости рта, на красной кайме губ.

При отсутствии своевременного лечения через несколько недель язвы проходят но возбудители сифилиса остаются в организме и продолжают размножаться.

II период. На вторичной стадии сифилиса возбудители сифилиса из шанкра и лимфатических узлов разносятся по всему организму током крови, проникая в кожу, и вызывают повторное повреждение. По всему телу увеличиваются лимфатические узлы.

Его характерные симптомы:

- множественные высыпания на различных участках тела и слизистых оболочках (мягкое нёбо, миндалины, половые органы);
- увеличение лимфоузлов;
- подъем температуры;
- мелкоочаговое выпадение волос и наружной части бровей и ресниц;

- появление очагов обесцвеченной кожи (лейкодерма);
- бессонница, головная боль, снижение слуха;
- ночные боли в костях (чаще в голенях, в коленных, плечевых и других суставах).

Высыпания на коже. На лице они могут напоминать угревую сыпь, на туловище они бывают в виде узелковой угревой сыпи или пятен, на коже ладоней и подошв - в виде пятен медно-красного цвета. Высыпания располагаются изолированно друг от друга, не склонны к слиянию и шелушению, не вызывают зуда. Сыпь исчезает без лечения в течение нескольких недель или месяцев, не оставляя рубцов и стойких следов, затем появляется снова новой волной узелковых высыпаний. Высыпания в местах трения и повышенной потливости (на половых органах, в области промежности, заднего прохода, в подмышечных впадинах, между пальцами ног, под молочными железами у женщин, на шее у полных людей) постепенно разрастаются и изъязвляются, принимая вид «цветной капусты».

Высыпания на слизистых оболочках (мягкое нёбо и миндалины, половые органы) могут быть изолированными или сливаться в сплошные участки. Сыпь на слизистой гортани и голосовых связок приводит нередко к осиплости голоса. Одновременно во рту возникают мелкие эрозии, углубления рта - незаживающие трещины.

Мелкоочаговое выпадение волос и наружной части бровей и ресниц характерно для каждого шестого-седьмого больного сифилисом. Очаги выпадения волос напоминают «мех, изъеденный молью». Кожа в них не воспалена, не зудит, не шелушится. Поражение ресниц характеризуется их постепенным выпадением и последовательным отрастанием, вследствие чего ресницы становятся неодинаковой длины.

Появление очагов обесцвеченной кожи (лейкодерма) на боковой поверхности шеи у женщин в виде кружева («ожерелье Венеры») связано с поражением нервной системы и нарушением пигментообразования кожи. Иногда очаги лейкодермы появляются на туловище, спине, пояснице, конечностях. Лейкодерма не шелушится, не воспаляется, не болит.

При вторичном сифилисе начинают поражаться все органы и системы организма: печень, почки, желудок, сердце, кровеносные сосуды, опорно-двигательный аппарат, нервная система.

III период характеризуется поражением и образованием очагов разрушения в костях, головном и спинном мозгу, сердце, печени почках и других органах.



Сифилис излечим при условии, если своевременно поставлен диагноз и правильно проводится лечение. В противном случае он опасен серьезными

осложнениями.

Тот, кто прерывает лечение при исчезновении симптоматики, лечится нерегулярно, чаще всего выходит на тяжелейшие последствия сифилиса - прогрессирующий паралич, спинную сухотку и другие осложнения, приводящие к инвалидности и даже смерти.

Сифилис не оставляет иммунитета, поэтому им можно заразиться повторно!!!

УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ ИППП, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ СИФИЛИСА, ВАМ ПОМОГУТ:

- **верность в браке или одному сексуальному партнеру;**
- **использование средств индивидуальной защиты, в первую очередь, презерватива и растворов хлоргексидина или мирамистина;**
- **забота о своем здоровье и здоровье своего партнера (осмотры у гинеколога, уролога, дерматовенеролога).**



ИППП

Будьте бдительны!

Если Вам не удалось избежать случайной половой связи, обязательно подстрахуйтесь: **не позже 2-х часов после сомнительного контакта** обратитесь в пункт индивидуальной профилактики, где Вам бесплатно окажут анонимную квалифицированную медицинскую помощь.

тел. в г. Бресте
+375 162 53-05-21
+375 29 205-34-30
(круглосуточно)



Учреждение здравоохранения
«Брестский областной кожно-венерологический диспансер»

Брест, 2025

Сифилис